

PRUEBAS DE LABORATORIO EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

EVENTO	MUESTRA	MATERIAL DE RECOLECCIÓN	DOCUMENTACIÓN ANEXA	OBSERVACIONES
LEPTOSPIROSIS (ELISA IgM y MAT)	Se debe tomar 2 muestras de sangre, la primera el día de notificación del evento y la segunda se debe tomar a los 15 días después.	En tubo rojo seco.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B -Historia clínica de la atención.	Este tipo de laboratorio se analiza en la Secretaría de Salud Departamental (SSD).
SARAMPIÓN / RUBEOLA (IgM PCR)	Muestra de sangre, y orina.	Tubo rojo seco, 3 hisopos de alginato (1 x cada fosa nasal y faringe), 2 tubo seco con ssn 2cc para transporte de hisopos y frasco de orina.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B -Historia clínica de la atención.	Este tipo de laboratorio se analiza en el Intituto Nacional de Salud (INS).
TOSFERINA (cultivo-PCR)	Se debe tomar muestra de orina, hisopado nasofaríngeo y suero.	Frasco de orina- tubo seco con ssn 2cc, hisopo (hecho de poliéster conocido como dacrón, rayón, o nylon, con un mango suave y flexible hecho de aluminio o plástico.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B -Historia clínica de la atención.	Este tipo de laboratorio se analiza en el Intituto Nacional de Salud (INS).
PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA	Las muestras de heces fecales deben ser recolectadas dentro de los primeros 14 días luego del inicio de la parálisis. La cantidad mínima son 5 gramos.	Envases plásticos con tapa ancha de rosca y cierre hermético para recolección de materia fecal.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B -Historia clínica de la atención.	Este tipo de laboratorio se analiza en el Intituto Nacional de Salud (INS)
DENGUE	Tomar el IgM Dengue ELISA en pacientes con 5 o más días de inicio de la fiebre. Todo evento notificado como: Dengue Sin Signos de Alarma o Dengue Con Signos de Alarma. Si el paciente llega a la consulta antes de los 5 días de inicio de síntomas, por favor solicitar prueba y en la historia clínica se aclara que se le debe tomar el día que corresponde.	En tubo rojo seco.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B.	Este tipo de laboratorio se analiza en la E.S.E Carmen Emilia Ospina
LEISHMANIASIS VISCERAL (IgG)	Todo paciente con sospecha de Leishmaniasis Visceral, se le debe ordenar muestra de sangre en tubo rojo suero y enviar al laboratorio con copia de la ficha epidemiológica y copia de la H.C.	En tubo rojo seco.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B -Historia clínica de la atención.	Este tipo de laboratorio se analiza en la Secretaría de Salud Departamental
LEISHMANIASIS CUTÁNEA (frotis)	Para la Leishmaniasis Cutánea se debe ordenar frotis de la lesión. En caso de que la lesión este sobreinfectada el personal médico debe tener en cuenta la antibioticooterapia inicial para garantizar calidad de la muestra.	Porta objeto -lanceta	Solicitud de laboratorio en formato del INS copia de la ficha epidemiológica cara A y B.	Este tipo de laboratorio se analiza en la E.S.E Carmen Emilia Ospina
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA (ETA):	Todo paciente con diagnóstico de enfermedad transmitida por alimentos, el médico debe ordenar la recolección muestra de materia fecal (coprológico).	Envases plásticos con tapa ancha de rosca y cierre hermético para recolección de materia fecal.	Solicitud de laboratorio en formato del INS - copia de la ficha epidemiológica cara A y B.	Este tipo de laboratorio se analiza en la Secretaría de Salud Departamental (SSD).
TUBERCULOSIS PULMONAR	Solicitarle al paciente que deposite en envase plástico una muestra de Espudo, explíquelo al paciente que tome aire profundamente, llenando los pulmones tanto como le sea posible, retenga el aire por un momento. Luego expúlselo con fuerza en un esfuerzo de tos desde los pulmones y arroje la muestra depositándola en el frasco. Se recoge la primera muestra en el momento de la consulta, la segunda muestra la debe recolectar el paciente en su casa por la mañana al despertar (muestra matinal). La tercera muestra, se toma en el servicio de salud, cuando el paciente concurre a entregar la segunda.	3 Envases plásticos con tapa ancha de rosca y cierre hermético para recolección de baciloscopias.	Solicitud de laboratorio	Este tipo de laboratorio se analiza en la E.S.E Carmen Emilia Ospina

Definiciones

SSA: Sin Signos de Alarma. **CSA:** Con Signos de Alarma. **HC:** Historia Clínica. **INS:** Instituto Nacional de Salud. **SSD:** Secretaria de Salud Departamental

Todos estos eventos requieren la muestra de laboratorio para su confirmacion y/o descarte. El no solicitar y tomar la prueba para su posterior analisis se convierte en falla para el sistema de vigilancia epidemiologica